


ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Η παθογένεια των συριγγίων είναι ίδια με αυτή των αποστημάτων. Το απόστημα αντιπροσωπεύει την οξεία φάση, το συρίγγιο το χρόνιο επακόλουθο.

ΤΥΠΟΙ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ριζική θεραπεία είναι αποκλειστικά η χειρουργική εκτομή του συριγγίου με R/F και U/S.

ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ

Η κύστη κόκκυγος εντοπίζεται στην πίσω επιφάνεια των τελευταίων σπονδύλων του ιερού οστού και του κόκκυγος. Συνήθως παρατηρείται σε νέα άτομα, συχνότερα στους άντρες και ιδίως δασύτριχους.

ΑΙΤΙΑ

Αιτία θεωρείται ο ερεθισμός και τραυματισμός του δέρματος της περιοχής από τρίχες οι οποίες διεισδύουν στο δέρμα και δημιουργούν τριχοφωλιακό συρίγγιο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση της κύστεως και των συριγγίων. Μετά το τραύμα μπορεί να συρραφεί τελείως, να μαρσιποποιηθεί ή να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό.

Dr. Μανώλης Ν. Γερογιώργης

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών • Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Νέο Αθήναιον MD Hospital, Αστυδάμαντος 83, Αθήνα,
τηλ. 6944 561030, 6949 479717, 210-7228511
www.mgerogiorgis.com

Παθήσεις ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

Οι παθήσεις του πρωκτού είναι από τις συνηθέστερες παθήσεις και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι διαταραχές αυτές διαγιγνώσκονται ή αντιμετωπίζονται λανθασμένα οδηγώντας μερικές φορές σε καταστροφικές συνέπειες.

- Αιμορροΐδες
- Ραγάδα πρωκτού
- Αποστήματα
- Συρίγγιο
- Κύστη κόκκυγος



Dr. Μανώλης Γερογιώργης, ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ


Οι αιμορροΐδες υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Πρόβλημα υπάρχει όταν αυτές διογκωθούν, οι ιστοί που τις συγκρατούν χαλαρώσουν και προβάλλουν κάτω από τον πρωκτικό δακτύλιο. Ο όρος αιμορροΐδες χρησιμοποιείται από τους ασθενείς για κάθε πάθηση ή ενόχληση του πρωκτού, ιατρικά όμως ο όρος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει σαφή συμπτωματολογία, όπως

• Πόνος στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου

- Αιμορραγία
- Έκκριση βλέννης
- Τοπικός ερεθισμός
- Κνησμός
- Ασυμπτωματική ή επώδυνη διόγκωση
- Αίσθημα ατελούς αφόδευσης

ΑΙΤΙΑ

- Υπερτονικός σφιγκτήρας
- Χρόνια δυσκοιλιότητα
- Κληρονομική προδιάθεση
- Εγκυμοσύνη
- Άρση βάρους
- Έντονος – χρόνιος βήχας



Οι αιμορροΐδες μπορεί να είναι εσωτερικές και εξωτερικές και ανάλογα με την έκταση της νόσου χωρίζονται οι εσωτερικές σε 1ου – 4ου βαθμού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συντηρητική αγωγή ακολουθείται για την αντιμετώπιση ορισμένων συμπτωμάτων και περιλαμβάνει καλή τοπική υγιεινή, διόρθωση της δυσκοιλιότητας, αντιφλεγμονώδη φάρμακα είτε per os, είτε τοπικά.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αιμορροΐδεκτομή κατά Logo, σύμφωνα με την οποία οι αιμορροΐδες δεν αφαιρούνται, αλλά με τη βοήθεια ενός ειδικού κυκλικού συρραπτικού μηχανήματος διακόπεται η αιμάτωση τους και έλκονται προς τα πάνω. Η παραπάνω θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες και πλέον αποτελεσματικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της αιμορροΐδοπάθειας. Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η αιμορροΐδεκτομή με R-F, U/S και η τεχνική κατά HAL.

ΡΑΓΑΔΑ

Η ραγάδα του πρωκτού είναι ένα γραμμωτό έλκος στο κατώτερο τμήμα του πρωκτικού αυλού.

ΑΙΤΙΑ

- Δυσκοιλιότητα
- Εγκυμοσύνη
- Κατάχρηση καθαρτικών
- Υπέρταση του πρωκτικού σφιγκτήρα



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Συμπτωματική αντιμετώπιση (διόρθωση της δυσκοιλιότητας, υγιεινή της περιοχής και τοπική θεραπεία με αλοιφές)
- Χειρουργική αντιμετώπιση: Η πλέον αποτελεσματική, ανώδυνη και ασφαλής μέθοδος είναι η κλειστή μερική πλάγια έσω σφιγκτηροτομή.

ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ

Περιεδρικό απόστημα είναι η φλεγμονή στην περιοχή του πρωκτού. Αυτό μπορεί να είναι περιπρωκτικό, μεσοσφιγκτηριακό ή ισχιορθικό ανάλογα με το χώρο του σώματος που καταλαμβάνει.

